

PRODUCTOS
VETERINARIOS

CATÁLOGO 2021



Agroservet

Guatemala





¡Estamos Celebrando!



GENERANDO GANANCIAS EN SUS ANIMALES

20 AÑOS

Agroservet

Guatemala



Todos y cada uno de nosotros hemos colocado un grano de arena en el crecimiento de esta empresa y por eso la sentimos tan nuestra, tan parte de nuestras vidas.

Queremos celebrar este aniversario como una gran familia.



📍 5ta. calle 2-05 zona 9
Guatemala C.A.

📞 Móvil: (502) 5527-6624
Oficina: (502) 2362-9338

📧 info@agroservet.com.gt
www.agroservet.com.gt



Productos Esenciales en tu Ganaderia

“Porque para VICAR FARMACÉUTICA S.A. la calidad no tiene precio”.



Somos una compañía fundada hace más de medio siglo. Siempre nos hemos identificado y enorgullecido de ser una empresa altamente creativa e innovadora.

Con un enfoque implacable en la calidad de nuestros productos y nuestra gente, buscando siempre que la salud humana y animal se beneficien a través del uso de nuestros medicamentos.

www.vicar.com.co





STROGEN-50

PROMOTOR DE CRECIMIENTO

STROGEN-50

Anabólico de alta concentración para el engorde y desarrollo óseo de bovinos, toretes, novillos o vacas en desecho, equinos y porcinos.

Dosis: 1 ml por cada 200 libras
Administración: intramuscular profunda

Presentación: 250 y 500 ml
 Boldenona Undecilinato 5 g.
 Excipientes C.S.P.



OXITETRACICLINA 5%

ANTIMICROBIANOS

OXITETRACICLINA 5%

Clorhidrato de oxitetraciclina 5 %
 Clorhidrato de Lidocaína 2 %

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro y tratamiento de anaplasmosis. Indicado en todas las especies.

Para tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, como anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp, haemophilus y leptospira sp.

Dosis: Preventiva 1 ml por 22 libras
 Curativa 3 ml por cada 44 libras
Administración: vía intramuscular profundo por 3 a 4 días.

Presentación: 10, 50, 100, 250, 500 ml



PANAMICINA L.A. 20 %

ANTIMICROBIANOS

PANAMICINA L.A. 20 %

Oxitetraciclina dihidrato 200 mg.

Antibiótico de amplio espectro, alta concentración, rápido efecto, terapéutico de larga acción. Para tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, como anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp, haemophilus y leptospira sp.

Dosis: 1 ml por cada 22 libras, en aves 0.25 ml por 1 kg de peso vivo, subcutánea
Administración: intramuscular profunda.

En lechones con peso menor a 10 kg, subcutánea
Presentación: 50, 100, 250 y 500 ml.

TILOVET

Tilosina B ase 200.0 mg
Exipiente csp 1.0 ml

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones causadas por: *Corynebacterium pyogenes*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus spp*, *Fusobacterium necroprorum*, *Actinomyces pyogenes*, *Mycoplasma hyosynoviae*, *Brachyspira hyodicerteriae*, *Campylobacter coli*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma mycoides var. Capri*.

NO ADMINISTRAR EN EQUINOS

Dosis: Cerdos: 1 ml por cada 10 a 20 KPV diario por 3 días. Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml por cada 20 a 40 KPV, diario por 5 días.

Administración: vía intramuscular

Presentación: 50, 100 y 250 ml

VICARPEN

Penicilina Procaina USP 255 000 U.I.
Penicilina Potásica USP 75 000 U.I.
Streptomycin base (como sulfato) 300 gm

Antibiótico indicado en infecciones producidas por microorganismos gram positivos y gram negativos, que provocan infecciones de carácter general o en cavidades como útero o glándula mamaria, de uso en bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.

Dosis: 20 ml. por 3 días continuos.

Administración: vía intramuscular profundo

Presentación: 20 ml. 6,000,000 ui

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

ANTIMICROBIANOS



TILOVET



ANTIMICROBIANOS



VICARPEN





UNIMAST

ANTIMICROBIANOS

UNIMAST-20

Spiramicina base 60,000.00 U.I.
Excipientes C.S.P. 100 ml.

Indicado en mastitis, metritis, pododermatitis, neumonías en bovinos, ovinos y porcinos.

Dosis: Bovinos adulto: 5 ml por cada 100 kg. de peso Terneros, porcinos y ovinos: 5 ml. por cada 40 kg.

Administración: intramuscular, en casos agudos repetir la dosis a la 24 o 36 horas

Presentación: 25, 50, y 250 ml



MASTIZONE V.S.

ANTIMICROBIANOS

MASTIZONE V.S.

Gentamicina (sulfato) 400 mg
Excipientes c.s.p 10 g

Mastizone V.S (Vaca Seca) es indicado para prevención de la mastitis durante el período seco (fuera del periodo de lactancia) y en el tratamiento de las mastitis existentes en el momento del secado.

Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única

Presentación: jeringa de 10 g



SECALAK

ANTIMICROBIANOS

SECALAK

Espiramicina base 1,200,000 UI
Neomicina como sulfato 170,000 UI
Exipiente csp 5 ml

La asociación de la Espiramicina y la Neomicina produce una potente acción bactericida contra los gérmenes causantes de la mastitis, tales como: Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtherie, Bacilus anthracis, E coli, Enterobacter aerogenes, Proteus, Shiguella, Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella y Streptococcus sp.

Administración: Intramamaria

Presentación: Jeringa de 10 ml

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

MASTIZONE

Cefoperazona sódica 250 mg
Excipientes c.s.p 10 ml

Indicado para mastitis subclínica y clínica causadas por bacterias sensibles a la cefoperazona sódica, y con amplio espectro de acción contra microorganismos aerobios y anaerobios gram positivos y gram negativos.

Dosis: 1 jeringa por $\frac{1}{4}$ de ubre, dosis única

Presentación: jeringa de 10 g

LACTOMAST

Espiramicina base 200 mg
Betametasona sódio fosfato 4 mg
Neomicina 500 mg
Excipiente csp 10 ml

En vacas en periodo de lactancia como antibiótico, anti-inflamatorio y para el tratamiento y control de infecciones causada por Streptococcus sp, Escherichia coli, Corynebacterium sp, Proteus sp, Klebsiella sp, y Mycoplasma sp.

Observación: ordeñar completamente, limpiar y desinfectar la ubre, aplicar una jeringa en cada cuarto, efectuar un suave masaje en la ubre para lograr la difusión del producto.

Tiempo de retiro en Leche: 120 horas, en carne no aplica

Administración: vía Intramamario

Presentación: Jeringa de 10 ml

ANTIMICROBIANOS



MASTIZONE



ANTIMICROBIANOS



LACTOMAST



Productos Lideres a nivel mundial

Lo que todo **GANADERO** necesita



GENERANDO OPORTUNIDADES EN SUS ANIMADOS
20
AÑOS



UCBVET
Saúde Animal



Los problemas de mastitis hacen mucho daño a la economía de las lecherías. Si no se ha podido prevenir con buenas prácticas de ordeño, la solución debe ser muy puntual y precisa.

Te asesoramos y acompañamos todo el año
con marcas de calidad mundial



Somos una empresa dedicada a la importación, distribución y venta a nivel nacional de medicina y equipo veterinario, semillas de pasto y sorgos forrajeros de alta calidad. Comprometidos con nuestros clientes satisfaciendo cada una de sus necesidades brindándoles asesoría y un excelente servicio.



MASTIZONE PLUS LACTACION

ANTIMICROBIANOS

MASTIZONE PLUS LACTACION

Gentamicina (sulfato) 150 mg
 Bromexina (clorhidrato) 50 mg
 Excipientes c.s.p 10 g

Mastizone Plus es indicado en el tratamiento de mastitis subclínicas y clínicas (agudas y crónicas). La asociación con la bromexina permite mayor penetración y difusión del antimicrobiano hasta el local de la infección, resultando en un tratamiento más eficaz previniendo reincidencias.

Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única
Presentación: jeringa de 10 g.



BOVIPUR 25% + CO

ANTHELMINTICOS

BOVIPUR 25% + CO

Albendazole 25.0 g.
 Cobalto 3.2 g.

Para el control de parásitos pulmonares, gastro-intestinales, tenias y fasciola hepática. De acción ovicida, larvicida, sobre formas adultas y quísticas.

Dosis: 1 ml por cada 50 kg. Para fasciola hepática duplicar la dosis, 2 ml por cada 50 kg.

Administración: oral o intrarruminal

Presentación: 20, 120, 500 ml. 1, 2 y 4 litros



FENLAK 10 %

ANTHELMINTICOS

FENLAK 10 %

Fenbendazol 100 mg.

Antiparasitario para el control de fases adultas, inmaduras, larvas inhibidas y huevos en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos.

Dosis: 1 ml para 44 libras. excepto en equinos. En equinos 1 ml para 100 Libras de peso.

Tiempo de retiro en leche **CERO DÍAS**

Administración: vía oral.

Presentación: 120, 500 ml., 1 y 2 litros

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

EQUIPUR

Mebendazole 20 g.
Excipientes c.s.p 100 ml

En equinos, mulares y asnales para el tratamiento de infestaciones parasitarias, ocasionadas por oxyuris, strongylus vulgaris, strongylus edentatus, strongylus equinus y parascaris equorum.

Dosis: 5 ml para 220 libras de peso.

Administración: vía oral.

Presentación: jeringa de 20 ml.

ANTHELMINTICOS



EQUIPUR



LEVAMISOL AL 15%

Levamisol Hcl 15 g.

Desparasitante potente y concentrado de amplio espectro, indicado para erradicar los parásitos pulmonares y gastrointestinales.

Dosis: 1 ml por cada 66 libras de peso.

Dosis máxima en adultos 10 ml

Administración: intramuscular profundo
(No usar en equinos).

Presentación: 100, 250 y 500 ml.

ANTHELMINTICOS



LEVAMISOL AL 15%





**PLATELMIN PLUS
THERAX PLUS**

ANTHELMINTICOS

PLATELMIN PLUS THERAX PLUS

praziquantel 50mg.
 promoato de pirantel 144 mg.
 febantel 150 mg

Completa asociación como vermífugo para canes, combatiendo formas adultas y larvales de ascaridos, ancilostomidos, tricuridos y cestodos en canes.

Dosis: vía oral, hasta 2 kg 1/4 de tableta, de 2 a 5 kg 1/2 tableta, de 5 a 10 kg 1 tableta, más de 10 kg 2 tabletas

Presentación: en caja de 4 tabletas.



PUPPY SHAMPOO

**ANTISÉPTICOS Y
DESINFECTANTES**

PUPPY SHAMPOO

Irgasan DP 300
 Dietanolamina de ácidos grasos de coco
 Lauril éter sulfato de sodio
 Genapol LRO 3000
 Mackamide CP
 Excipientes C.S.P

Shampoo puppy para la limpieza del pelo y control de infecciones menos en la piel, con acondicionador, en especial para lavar, limpiar, brillar, suavizar y desenredar el pelo de sus animales, dejándolos limpios, suaves, sedosos y con un brillo natural, fácil de peinar sin dejar manchas en el pelo. Aplíquelo hasta lograr una buena espuma, deje actuar durante 5 minutos y proceda al enjuague total.

De uso para canes, equinos y bovinos.

Presentación: 250 y 2000 ml

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

GLUCONATO DE CALCIO AL 20%

Gluconato de calcio. (1.9 g de Calcio.) 20 g.
Excipientes C.S.P. 100 ml

Solución inyectable, para tratar la hipocalcemia (fiebre de leche) raquitismo por deficiencia de calcio, osteoporosis y otros trastornos ocasionados por la deficiencia de calcio. Indicado en todas las especies.

Dosis: 110 ml. por cada 100 kg. de peso vivo.

En perros, 11 ml. por cada 10 kg. de peso vivo.

Administración: Intravenosa, intramuscular.

En equinos vía intravenosa.

Presentación: 100, 250 y 500 ml

CALCIOS Y
PREPARACIONES



GLUCONATO DE CALCIO.
AL 20%



CALCIOS Y
PREPARACIONES



NOVAFOS

NOVAFOS

Gluconato de calcio 90.6 g
Aidróxido de magnesio 8.5 g
Ácido hipofosforoso 20.5 g
Dextrosa anhidra 82.5 g

Para el tratamiento de enfermedades metabólicas producidas por deficiencia de calcio, magnesio, fósforo: fiebre de leche, hipofosfatemia, tetania de pastos, cetosis bobina. Coadyuvante en el tratamiento del raquitismo y osteomalacia síndrome de la vaca caída: en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Dosis: Bovinos y equinos 150 ml por 220 libras; porcinos y ovinos 15 ml por 22 libras; terneros recién nacidos 10 ml intramuscular por 3 días.

Administración: intravenosa lenta o intraperitoneal.

Presentación: 500 ml





GENERANDO GANANCIAS EN SUS ANIMALES

20
AÑOS

Agroservet
Guatemala






GENERANDO GANANCIAS EN SUS ANIMALES

20
AÑOS

Agroservet
Guatemala
Guatemala

The logo features a stylized green and yellow leaf above the text. Below the main text is a silhouette of a herd of animals (cows and horses) flanked by horizontal lines in green, yellow, and red.





HEMATURINA

CALCIOS Y PREPARACIONES

HEMATURINA

Fosfato de Calcio Dibásico 7g
 Calcio Gluconato 1.75g
 Calcio Carbonato 0.75g
 Aporta 2.52 de ion Calcio

Coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de calcio en todas las especies.

Dosis: 2-2.5g/100k p.v. 2 choques c/3 días

Administración: oral en el agua de la bebida.

Presentación: en sobres de 10 g.

En forma de polvo soluble.



FIPRO TOPSPOT

ECTOPARASITICIDAS

FIPRO TOPSPOT

Fipronil 100 mg
 Excipientes C.S.P. 1 ml

Indicado para controlar y tratar la infección por pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos. Ayuda al control de la dermatitis alérgica producida por picadura de pulga.

Dosis: aplicar la totalidad del producto directamente sobre la piel, separando el pelo del animal.

No bañar al animal dentro de las 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento.

Presentación: Para Gatos >1Kg 0.50 ml

Perros de 2 a 10 kg, 0.67 ml

de 10 a 20 kg, 1.34 ml

de 20 a 40 kg, 2.68 ml

de 40 a 60 kg, 4.02 ml

>60 kg, 2 x 2.68 ml

TERMINATOR

Cipermetrina técnica 15 %

Para el control de infestación de moscas y garrapatas

Dosis: 20 ml por mochila de 20 litros.

Administración: Aplicar mediante baño de aspersión a razón de 4 litros por animal adulto.

Presentación: 20, 120, 500 y 1000 ml

CYPERMETRIL POUR ON

Cipermetrina 5g
Excipientes C.S.P. 100 ml.

Posee acción sobre la mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*), la mosca de los cuernos (*Haemotobia irritans*), garrapatas, piojos y ácaros de la sarna, con efecto prolongado. Disminuye las reinfestaciones por tórsalo o nuche (*Dermatobia hominis*).

Dosis: Como mosquicida: 10 ml por animal como garrapaticida: 10 ml por cada 100 kg de peso

Administración: aplicar sobre el lomo del animal

Presentación: 1 litro

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

ECTOPARASITICIDAS



TERMINATOR



ECTOPARASITICIDAS



CYPERMETRIL POUR ON





**CYPERMETRIL
PULVERIZACION Y BAÑO**

ECTOPARASITICIDAS

CYPERMETRIL PULVERIZACION Y BAÑO

Cipermetrina 15 g
Excipientes c.s.p 100 ml

Piretroide concentrado emulsionable con acción garrapaticida y acaricida, altamente eficaz contra garrapatas, moscas, piojos y ácaros de la sarna con efecto prolongado.

Dosis: 20 ml por mochila de 20 litros

Administración: mediante baño de aspersión

Presentación: 1 litro



SUPOKILL

ECTOPARASITICIDAS

SUPOKILL

Clorfenvinfós (supona) 50 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

Formula exclusiva de la familia de los órganos fosforados, concentrado emulsionable de uso tópico para el control de garrapatas, ácaros de la sarna, moscas, piojos, pulgas y miasis.

Producto único en Guatemala.

Dosis: 1 ml por litro de agua Para el control de garrapatas: repetir 5 o 6 veces cada 25 días.

Administración: aplicar mediante baños de aspersión.

Presentación: 20, 100 ml y 1 litro



AMITRAZ

ECTOPARASITICIDAS

AMITRAZ

Amitraz 12.5 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

Para el control de infestaciones de garrapatas (*boophylus* y *amblyomma*) y sarna en bovinos.

Dosis: 33 ml por mochila de 20 litros.

No usar en equinos

Se aplica mediante baño de aspersión.

Para boophylus: repetir cada 21 días

Para amblyomma: repetir cada 8 días

Presentación: 33,120, 500 ml y 1 litro.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

IVERMECTAN

Ivermectina 1%

Para el control de parásitos gastro intestinales pulmonares, efectivo en el control de garrapatas, piojos, tórsalo y sarna. Ayuda en el control de la mosca de los cuernos y previene la miasis en el ombligo de los terneros recién nacidos. Puede ser usado en vacas preñadas, hasta el sexto mes de preñez.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso

Administración: vía subcutánea

Presentación: 500 y 1000 ml.

ENDO-
ECTOPARASITICIDAS



IVERMECTAN



EQUIMEC600

Ivermectina 1.87 g
Exipientes c.s.p. 100 g

Desparasitante interno de amplio espectro para equinos, mulares y asnales.

Dosis: 6.42 g. para 600 kg de peso y 4.28 g para 400 kg de peso pasta para administración oral.

Presentación: 6.42 g.

ENDO-
ECTOPARASITICIDAS



EQUIMEC600





GENERANDO GANANCIAS EN SUS ANIMALES

20
AÑOS

Agroservet
Guatemala





GANANCIAS EN SUS ANIMALES
20 AÑOS

Agroservet
Guatemala
Guatemala





PRIMEC

ENDO-
ECTOPARASITICIDAS

PRIMEC

Eprinomectina 0.50 g
Excipientes C.S.P. 100 ml

Solución tópica para el control de parásitos interno y externos, (incluyendo las formas inhibidas de las ostertagia), parásitos pulmonares, nuches, mosca brava, piojos chupadores y masticadores, ácaros de la sarna. Puede ser usado en los diversos estados de preñez.

CERO DÍAS DE RETIRO EN LECHE Y CARNE

Administración: Tópico sobre el lomo del animal
Presentación: 20 y 500 ml



VIMEC 1 %

ENDO-
ECTOPARASITICIDAS

VIMEC 1 %

Ivermectina 10 g.
Excipientes C.S.P. 1 ml

Para el control de parásitos gastrointestinales pulmonares, y parásitos externos como garrapatas, colmoyate y acaros de la sarna.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.

Administración: subcutánea.

Presentación: 1, 25, 50, 100 y 250 ml



VIMEC L.A.

ENDO-
ECTOPARASITICIDAS

VIMEC L.A.

Ivermectina 1%

Para el control de parásitos gastrointestinales pulmonares, y parásitos externos como garrapatas, colmoyate y ácaros de la sarna.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.

administración: subcutánea e intramuscular.

Presentación: 500 ml.

PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
CATÁLOGO
2021

VIMEC TOP 3.15 %
Ivermectina 3.15%

Para el control de parásitos gastrointestinales-pulmonares, y parásitos externos como garrapatas, colmoyate y ácaros de la sarna.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.

Administración: subcutáneo, Agítese antes de usar. (usar Aguja de calibre 15 a 20 mm)

Presentación: 500 ml

ENDO-
ECTOPARASITICIDAS



VIMEC TOP 3.15 %



IMICAR

Dipropionato de Imidocarb 12 g.

Para el tratamiento profiláctico y curativo de babesiosis (piroplasmosis) y anaplasmosis en bovinos.

Se recomienda el uso de Cacodil B-12 como reconstituyente de glóbulos rojos.

Dosis: babesiosis 1 ml. por 220 libras

Anaplasmosis: 2.5 ml por 220 libras

Administración: vía intramuscular en la base de la espalda.

Presentación: 10, 50 y 100 ml

HEMOPARASITICIDAS



IMICAR





TRISTEZINA

HEMOPARASITICIDAS

TRISTEZINA

Diaceturato de Diminazeno 70 mg
 Pirazolona (Dipirona) 370 mg
 Excipientes c.s.p 1 ml

Tristezina es indicada en los tratamientos de Babesiosis (piroplasmosis), Tripanosomiasis (cacho hueco) y papilomatosis. La pirazolona combate el dolor y la fiebre.

Dosis: 1 ml por cada 20 kg de peso
Administración: Intramuscular profunda
Presentación: 20 ml.



HORMOFISINA

OXITÓCICOS

HORMOFISINA

Oxitocina Sintética 10 U.I.
 Excipientes C.S.P. 1 ml.

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento del parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la hemorragia.

Dosis: Fines obstétricos: Vacas y yeguas 7.5 a 10 m; cerdas, ovejas y perras de 3 a 5 ml. Para descenso de leche: Vacas y yeguas 1-2ml, cerdas y ovejas de 0.5-1 ml., perras máximo 0.03 ml.
Administración: vía intramuscular o subcutánea.
Presentación: 10 ml



PLACENTINA OXITOCINA FUERTE

OXITÓCICOS

PLACENTINA OXITOCINA FUERTE

Oxitocina sintética 10 UI
 Excipientes 1 ml

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento del parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la hemorragia. También tiene acción sobre los alvéolos y ductos galactóforos aumentando el flujo de la leche, promoviendo el vaciamiento total de la glándula mamaria.

Dosis: depende de la especie y forma de administrar (ver inserto)
Administración: Subcutánea, intramuscular, intravenosa y epidural
Presentación: 20, 50 y 100 ml

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

CACODIL B-12

Cacodilato sódico 3 g
Cianocobalamina (B12) 4 mg
Tiamina (B1) 1 g
Riboflavina (B2) 400 mg
Piridoxina (B6) 500 mg
Niacina (B3) 10 g

Tónico reconstituyente concentrado para animales en rehabilitación por problemas de anemias, stress de viaje, y como tratamiento general en ganado de engorde y en terneros. Coadyuvante en el tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis.

Dosis: Bovinos y equinos adultos 10 ml.
Terneros, potros, porcinos y ovinos 5 a 8 ml.
Caninos 1 a 3 ml

Administración: Intramuscular o intravenosa.

Presentación: 10, 25, 50, 100, 250 y 500 ml

SOROVITA COMPLEX

Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) 500 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 80 mg
Vitamina B3 (Nicotinamida) 1,200 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 125 mg
Dextrosa 60,000 mg
Cloruro de Sodio 3,000 mg
Cloruro de Potasio 200 mg
Cloruro de Calcio 120 mg
Cloruro de Magnesio 50 mg
Metionina DL 3,000 mg
Cloruro de Colina 1,500 mg
Excipientes c.s.p 495 ml

Complejo de vitaminas y minerales importante para el correcto metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. siendo esencial en el crecimiento y nutrición. Se indica en todos los casos de caquexia, deshidratación en postoperatorio, estados tóxicos e infecciones hepatopatías, desnutrición, hemorragias, neuropatías, acetonemias, hipertrofias orgánicas, anemias, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Administración: se puede aplicar vía intravenosa, subcutánea o intraperitoneal. **Se recomienda la administración de una ampolla de Phenodral.**

Dosis: animales de porte grande 500 ml

Animales medianos 250 ml.

animales pequeños 20 a 50 ml

Presentación: 500 ml

VITAMINAS Y
MINERALES



CACODIL B-12



VITAMINAS Y
MINERALES



SOROVITA COMPLEX







GENERANDO CAMBIOS EN SUS ANIMALES
20
AÑOS

Agroservet

Guatemala





PHENODRAL

VITAMINAS Y MINERALES

PHENODRAL

Metilarsinato de Sodio 300 mg
 Citrato de Hierro Amoniacal 300 mg
 Solución Milesimal de Adrenalina 1.5 ml
 Excipientes c.s.p 15 ml

Tónico estimulante de las funciones metabólicas. Contribuye en el aumento de apetito y formación de la hemoglobina, responsable por la unión y transporte de oxígeno a los tejidos, proporcionando mejor rendimiento en los animales, utilizada también para la piroplasmosis.

Se recomienda una aplicación paralela con Cacodil B-12.

Dosis: Bovinos y equinos adultos...15 ml
 Bovinos y equinos jóvenes.....5 ml
 Caninos medianos y grandes.....2 ml
 Caninos pequeños.....1 ml

Administración: Intravenosa lenta

Presentación: ampolla de 15 ml.



FERREX B-1 2

VITAMINAS Y MINERALES

FERREX B-1 2

Hierro elemental 100 mg
 Cianocobalina (B12) 100 mg

Indicado para el tratamiento de anemias causadas por deficiencia de hierro en lechones de 2 a 3 días y hasta 2 meses, en terneros por deficiencia de B12.

Dosis: Lechones 1 ml a los 3 días de nacidos y terneros lactantes 3 a 5 ml.

Administración: intramuscular.

Presentación: 10, 50 y 100 ml

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

SELOFOS

Fosforilcomina100 mg
Yoduro de potasio...20 mg
Sulfato de zinc.....15 mg
Selenito de sodio....219 mg

Estimulante de la reproducción para el tratamiento de la deficiencia de fósforo, yodo, zinc y selenio. Coadyuvantes en el **tratamiento de trastornos reproductivos** aumentando los porcentajes de preñez y natalidad de los hatos. Indicado en bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos.

Dosis: 1 ml por cada 44 libras en varios sitios.

Administración: intramuscular subcutánea o intravenosa.

Presentación: 50, 100 y 250 ml

CURSOTRAT

Colargol (Plata Coloidal) 0.12 g
Excipientes c.s.p 10 ml

Tratamiento de las diarreas de origen infeccioso (diarrea con sangre y diarrea negra). La Plata Coloidal (Colargol) posee una poderosa acción bacteriostática y cuando es inyectada provoca una intensa leucocitosis aumentando la resistencia orgánica del animal contra los procesos infecciosos. Ejerce una acción oxidativa sobre las toxinas bacterianas reduciéndolas a sustancias inocuas al organismo.

Producto único en Guatemala.

Dosis: Bovinos y equinos adultos 10 ml

Bovinos y equinos jóvenes, porcinos, ovinos y caprinos adultos 5 ml Porcinos, caprinos jóvenes y caninos adultos 2 ml

Presentación: 10 y 50 ml.

VITAMINAS Y
MINERALES



SELOFOS



ANTIDIARREICO



CURSOTRAT





VERRUTRAT

**TERAPEUTICO
HORMONAL**

VERRUTRAT

Clorobutanol 5 g
Excipientes c.s.p 20 ml.

El Clorobutanol actúa en el metabolismo del virus causador de la papilomatosis (verrugas), impidiendo su crecimiento, en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos. El clorobutanol también tiene un alto poder antiséptico y es un anestésico local haciendo con que la aplicación del producto sea indolora.

Después de su aplicación las verrugas desaparecen en un espacio de tiempo que varía entre 15 a 60 días sin dejar cicatrices y sin el resurgimiento de las mismas.

Dosis: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo en verrugas grandes, repetir la dosis a los 10 días.

Administración: Subcutánea o vía tópica

Presentación: 20 ml.



DIURIDEM

**ANALGÉSICOS
ANTI-INFLAMATORIOS**

DIURIDEM

Triclorometiazida 10 mg
Betametasona 0.55 mg
Excipientes C.S.P 20 ml, 50 ml.

En bovinos para el tratamiento del edema fisiológico de la glándula mamaria y estructuras asociadas durante el postparto y en afecciones edematosas y no inflamatorias de los bovinos y equinos.

Dosis: Bovinos 1 ml por 20 kg PV (máx.. 20 ml por aplicación), diario durante 3 días máximo.

Equinos: 1 ml por 90 kg PV, diario por 3 días máximo.

Administración: Intramuscular.

Presentación: 20 y 50 ml

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

FADYNE - A4

Flunixin Meglumina 50 mg.
Excipientes s.c.p 1 ml

Analgésico y antiinflamatorio asociado con desordenes musculo-esqueléticos y cólicos en los equinos. En bovinos, equinos y porcinos para el tratamientos de inflamación, fiebre y dolor en mastitis y metritis.
Antishock y antihistamínico.

Dosis: 2 ml por cada 100 libras de peso.

Administración: intravenosa o intramuscular profunda por 2 a 3 días.

Presentación: 10, 30 y 50 ml

ANALGÉSICOS
ANTI-INFLAMATORIOS



FADYNE - A4



ANTICION

Acetato de Medroxiprogesterona 5 g
Excipientes c.s.p 100 ml

Como inhibidor del estro (celo) en perras y gatas.

Dosis: 1 ml cada 6 meses.

Administración: Subcutánea

Presentación: ampolla de 1 ml

INHIBIDOR DE
CELO



ANTICION





PIGLINE

**PROMOTOR DE
CRECIMIENTO**

PIGLINE

Ractopamina HCl 20/1000 g
L-Carnitina, Harina de trigo, oxido de silicio y aceite vegetal.

Para mejorar la eficiencia alimenticia e incrementar la ganancia de peso en la finalización (+75 kg peso)

Dosis: 500gr/ton de alimento (16% de alimento) preparar premezcla con 20kgs de subproducto de molinería.

Administración: oral en el alimento.

Presentación: 5 kg



PROMOMIX 40 %

**SANITIZANTE
INTESTINAL**

PROMOMIX 40 %

Halquinol 40g
Harina de trigo, aceite vegetal, oxido de silicio.

Mejora la eficiencia alimenticia e incrementa la ganancia de peso en cerdos y aves.

Dosis: 60ppm de 75 a 150 g / ton. de alimento

Administración: en alimento balanceado.

Presentación: 1 y 5 kg.



MICOMIX

ANTIPLASMATICOS

MICOMIX

Tiamulina fumarato hidrogenada 10g/1000g

Aves: Antimicoplasmacida. Contra staphylococcus, chlostridium.

Cerdos: Contra disentería porcina (serpulina) Pleuronemocia contagiosa. Haemophyllus.

Dosis: Aves: 25*-75mg/kg p.v.

Cerdos: 5-10mg/kg p.v. lleitis 2-3mg/kg p.v.

Administración: oral en premezcla con los alimentos.

Presentación: 1, 2 y 5 kg.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CATÁLOGO 2021

TRISULMIX 1 5%

Sulfadiazina sodica 62.5mg
Trimethoprim 12.5mg

Antibiótico en aves y cerdos

Dosis: 1gr/4-4.5 L por 7 días.
Administrar en el agua de bebida.

Presentación: 1 y 5 kg.

AVEX 20 %

Enrofloxacin 200 mg

Antibiótico bactericida de amplio espectro en enfermedades respiratorias y digestivas. Agentes gram y micoplasmas coriza, escherichia, staphylo y estreptococos y pseudomona.

Dosis: 10mg/kg o 50mg/100lts por 3 días

Administración: oral en el agua de la bebida consumida totalmente en un lapso de 3 a 5 horas.

Presentación: 20, 100 ml y 1 litro.

CIPROVIC

Ciprofloxacina Clorhidrato 20g

Contra enfermedades respiratorias causadas por micoplasmas, haemophyllus y pasteurella.y del sistema digestivo por escherichia coli.

Dosis: Aves: 10mg/kg p.v. por 3 a 5 días (100g/500L).

Presentación: 25 g.

ANTIBACTERIALES



TRISULMIX 1 5%

ANTIBACTERIALES



AVEX 20 %

ANTIBACTERIALES



CIPROVIC



www.agroservet.com.gt